

TABS CHLORINE



DIKLÓRIZOCIANURÁTOT TARTALMAZÓ FERTŐTLENÍTŐ PEZSGÓTABLETTA

- EN Tesztek*: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777
- Magas klórtartalom
- Kiváló oldhatóság

CHLORINE

Diklórizocianurát tartalmú fertőtlenítő hatású pezsgótabletta kemény felületek fertőtlenítésére. A termék élelmiszeripari területeken is használható felületek, konyhai eszközök és edények tisztítására és fertőtlenítésére. Használat után az eszközöket bő vízzel öblítse le.

ÖSSZETÉTEL: 100g termék tartalmaz: Diklórizocianurát 80,77g, segédanyag 100g-ig.

Megfelel a következő EN vizsgálati szabványoknak*: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777.

HASZNÁLAT

- Fertőtlenítő baktericid és fungicid hatás (kemény felületeken): gondosan tisztítsa meg a kezelendő felületet, majd oldjon fel 1 tablettát 2,5 liter vízben, vigye fel az oldatot közvetlenül a felületre, hagyja hatni 15 percig.
- Fertőtlenítő virucid hatás (kemény felületeken): gondosan tisztítsa meg a kezelendő felületet, majd oldjon fel 1 tablettát 1 liter vízben, vigye fel az oldatot közvetlenül a felületre, hagyja hatni 60 percig.
- Áztató edények tisztítása: mosási ciklusonként oldjon fel egy tablettát.



HIGITAS

Használatra kész.

TABS CHLORINE

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: Tabletta

SZÍN: Fehér

ILLAT: Technikai

COV: 0,00%

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás(cP)	Totál száraz. [%]
Sol. 1%: 6,5 ± 0,5	> 95	-			

További információ: Minden doboz 150 tablettát tartalmaz.

Minden egyes tablettá 3,34g, tartalmaz 2,70 g diklórizocianurátot (1,5 g aktív klórnak felel meg).

FIGYELMEZTETÉSEK

Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Figyelem! Ne használja együtt más termékekkel. Veszélyes gázokat bocsáthat ki (klórgáz). Viseljen szem/arcvédőt. **LENYELÉS ESETÉN:** Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz. **SZEMIRRITÁCIÓ ESETÉN:** Óvatos öblítés néhány percig. Konkatlencsék eltávolítása, ha van és könnyen megtehető. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz. Száraz helyen tartandó. Zárt edényben tartandó. 40°C hőmérséklet alatt tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően. Diklórizocianurátot tartalmaz.



FIGYELEM



FIGYELEM

MEGJEGYZÉSEK

Száraz, szobahőmérsékletű helyen tartandó. Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket.

Sutter Professional nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

* A fertőtlenítőszerregisztrációjával kapcsolatos szabályozások országonként eltérhetnek.

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszárlás	Mennyiség	Raklap
567902	gr 500	12	12x6=72